

Số: /SNN-TT&BVTV
V/v tập trung chỉ đạo sản xuất vải
giai đoạn ra hoa

Bắc Giang, ngày tháng 02 năm 2024

Kính gửi: UBND các huyện Lục Ngạn, Tân Yên, Lục Nam,
Lạng Giang, Yên Thế, Sơn Động.

Hiện nay, trà vải sớm đang ở giai đoạn phát triển chùm hoa, tỷ lệ ra hoa ước đạt 70-80 %; trà vải vải chính vụ bắt đầu ra hoa, tỷ lệ ra hoa dự kiến khoảng 50-60%. Nguyên nhân do Mùa Đông năm 2023 có nhiệt độ bình quân cao hơn so với trung bình nhiều năm khoảng $1,5^{\circ}\text{C}$, làm ảnh hưởng đến quá trình phân hoá mầm hoa cây vải; bên cạnh đó thời tiết từ giữa tháng 1 /2024 đến giữa tháng 2/2024 có các đợt không khí lạnh ngắt ngày, kèm theo mưa nhỏ kéo dài khiến độ ẩm không khí, độ ẩm đất cao, kết hợp với thời gian dài có nền nhiệt độ cao, đây là những yếu tố làm cho nhiều diện tích vải có hiện tượng ra lộc hoặc ra hoa kèm lộc làm ảnh hưởng đến năng suất.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 22/2/2024 tiếp tục có đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc, khu vực vùng núi từ $15-17^{\circ}\text{C}$, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ. Để giúp tăng tối đa diện tích vải ra hoa đảm bảo năng suất, chất lượng; Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện trọng điểm sản xuất vải tập trung chỉ đạo cơ quan chuyên môn tuyên truyền, hướng dẫn nông dân bám sát vào diễn biến thời tiết, kết hợp áp dụng tổng hợp các biện pháp kỹ thuật trong giai đoạn này

1. Đối với trà vải sớm

Tập trung các biện pháp chăm sóc, tưới nước đủ ẩm, bón phân cân đối, sử dụng các loại phân bón lá giàu vi lượng (Bo, Botrax) để quá trình nở hoa, đậu quả được thuận lợi; tập trung điều tra theo dõi và phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh hại như: Bệnh sương mai, thán thư, sâu đo, bọ xít, rệp muội ... bằng những loại thuốc đặc hiệu.

2. Đối với trà vải chính vụ

- Đối với diện tích vải đã ra hoa: Cần tiến hành tưới nước nhẹ lên tán cây, sử dụng phân bón qua lá giàu vi lượng để cây ra hoa được thuận lợi và phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh hại giai đoạn ra hoa.

- Đối với diện tích vải vừa ra hoa vừa ra lộc: Không tưới nước nhằm hạn chế quá trình hình thành lộc. Những cây ra hoa kèm theo lộc, cần sử dụng biện pháp ngắt bỏ lá mọc kèm ngay khi lá non vẫn còn đỏ.

- Đối với diện tích vải chưa ra hoa: Tiếp tục hạn chế độ ẩm của đất và phun bổ sung các chế phẩm phân bón qua lá có hàm lượng lân và kali trung bình, giàu vi lượng, kết hợp với chất điều hòa sinh trưởng (Kích phát tố hoa trái Thiên Nông, Atonik...) để kích thích phát triển mầm hoa, ức chế sinh trưởng của lộc non. (Lưu ý: liều dùng theo khuyến cáo của đơn vị sản xuất).

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các huyện trọng điểm sản xuất vải thiều quan tâm chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Giám đốc sở (báo cáo);
- PGĐ Sở Lê Bá Thành;
- Báo Bắc Giang, Đài PTTH tỉnh (đưa tin);
- Chi cục TT&BVTV;
- Phòng NN&PTNT các huyện Lục Ngạn, Tân Yên, Lục Nam, Lạng Giang, Yên Thế, Sơn Động;
- Lưu VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Bá Thành